



La Florida 27 de mayo 2024

## COMUNICADO

Estimado/a Apoderado/a

Junto con saludar y esperando se encuentre bien, informamos a usted que, el día **jueves 30 y viernes 31 de mayo** se llevará a cabo en el Colegio la **“Vacunación Contra la Influenza”** exclusivamente para los niveles de kínder a 5° básico, a cargo del CESFAM Villa O'Higgins

**Es obligatorio que usted como apoderado/a lea la carta informativa adjunta.**

Recordar que la vacunación es obligatoria, por lo que NO se necesita autorización. **Para rechazar una vacuna deben seguir las indicaciones de la carta.**

Se despide cordialmente,

Equipo Directivo  
Colegio Brothers School



### Carta Informativa de Vacunación Contra la Influenza

*Estimados padres, tutores y/o apoderados:*

Junto con saludar, informo a usted que actualmente se está llevando a cabo la ***Campaña de Vacunación contra la Influenza correspondiente al año 2024***. Esta es una medida instruida por la autoridad sanitaria y su aplicación tiene carácter **OBLIGATORIO** por lo que **NO REQUIERE** la autorización por medio de consentimiento informado de los padres y/o apoderados; todo esto en conformidad con lo establecido en el artículo 32º del Código Sanitario. Por lo anterior, se ha dispuesto la vacunación en establecimientos educacionales, tanto públicos como privados, de todos los niños y niñas desde los 6 meses de edad hasta quienes estén cursando 5º básico.

***Si usted no desea*** administrar la vacuna a su pupilo, deberá acercarse a su Cesfam más cercano a firmar el formulario de rechazo, posterior a una consejería por un profesional de la salud. Mientras que el día de la vacunación, deberá informárselo verbalmente al equipo del centro educacional y a través de una comunicación escrita, en donde declare explícitamente, que usted acudirá al centro de salud a firmar dicho rechazo.

#### **¿Qué es la Influenza y por qué debemos prevenirla a través de la vacunación?**

La influenza es una enfermedad respiratoria aguda, causada por el virus Influenza perteneciente a la familia Orthomixoviridae. Es una infección que afecta principalmente a la nariz, la garganta, los bronquios y, ocasionalmente, los pulmones. El tiempo transcurrido entre la infección y la aparición de la enfermedad es de aproximadamente 2 días. La infección se caracteriza por la aparición súbita de fiebre alta, dolores musculares, cefalea, malestar general importante, tos seca, dolor de garganta y rinitis. En algunas personas se presenta también secreción nasal, náuseas, vómitos y diarrea.

La tos suele ser el síntoma más persistente, puede ser intensa y durar 2 semanas o más. No obstante, en grupos de riesgo como niños pequeños, personas de edad y personas aquejadas de otras afecciones médicas, pueden existir complicaciones graves tales como neumonía, insuficiencia respiratoria aguda o causar la muerte. La mejor forma de prevenir esta enfermedad, es a través de la vacuna contra la influenza.

#### **¿Qué esperar de la Vacuna contra la Influenza?**

Posibles reacciones a la vacunación:

- Fiebre, cefalea, sudoración, malestar general y fatiga.
- Reacciones locales: enrojecimiento e induración del sitio de punción, edema y dolor. Estas reacciones generalmente desaparecen sin tratamiento después de 1 – 3 días.



COMUDEF

Si su hijo/a o pupilo, posee alguna condición/alergia/contraindicación que amerite precauciones especiales o la suspensión de la vacunación, usted debe informar oportunamente con certificado médico u algún otro comprobante al profesor jefe del establecimiento educacional, si no, se dará por hecho de que puede recibir la vacunación.


**¿Quiénes no debieran vacunarse? (Contraindicaciones definitivas)**


- Hipersensibilidad a los componentes de la vacuna, entre los cuales se encuentran trazas de huevos (ovoalbúmina), formaldehído, bromuro de cetiltrimetilamonio, polisorbato 80 o gentamicina.
- La inmunización o vacunación, deberá ser postergada en pacientes/niños que estén cursando fiebre (mayor a 38°C) o una infección aguda.

**Recomendaciones post vacunación:**

1. Beber abundante líquido (agua, lactancia materna, según el caso o necesidad).
2. Aplicar compresas tibias en la zona de vacunación.
3. No abrigar en exceso.
4. No tocar la zona donde se ha vacunado.
5. Controlar la T° en caso de ser necesario.
6. No auto medicar, siempre administrar analgésicos o antiinflamatorios con indicación médica.

Se despiden atentamente,

  
Paulina Juri Villarroel  
Enfermera  
Rut: 17.560.876-1  
Enfermera PNI  
Cesfam Villa O'Higgins

  
Francisca Salgueiro Miles  
Directora  
Cesfam Villa O'Higgins